

Posmatranje zlatovrane (*Coracias garrulus*) u periodu gnežđenja u BanatuObservation of Roller (*Coracias garrulus*) during breeding period in Banat

Purger, J. J.

Primljeno (Accepted): 05. 05. 1998.

During June and July of 1990 and 1991, 1 or 2 Rollers were observed near the villages: Vatin (ER20 according to a 10x10 km scale grind map of UTM system), Bašaid (DR45), Padej (DR37), Jazovo (DQ87), in the Banat region (Vojvodina, Serbia).

O distribuciji i veličini populacije zlatovrane (*Coracias garrulus*) u Vojvodini, sudeći po podacima objavljenim u dosadašnjih šest brojeva časopisa "Ciconia", malo se zna. Samo u četiri rada se pominje ova vrsta i samo u jednom slučaju se piše o gnežđenju (Gergelj & Šoti, 1990).

Tabela 1. Datum, broj posmatranih primeraka zlatovrane, UTM i lokalitet
Table 1. Date, number of observed specimen of Roller, UTM and locality

Datum Date	Broj prim. No. of indiv.	UTM	Lokalitet Locality
14. 06. 1990.	1	ER20	3km istočno od Vatina
23. 06. 1990.	1	DR45	7km zapadno od Bašaida
23. 06. 1990.	1	DR37	4km jugoistočno od Padeja
04. 07. 1990.	1	DR48	2km jugoist. od Jazova
12. 07. 1990.	1	EQ08	2km jugoist. od Banatskog Karlovca
07. 06. 1991.	1	DR49	2km jugozapadno od Vrbice
13. 06. 1991.	2	EQ19	3km severozapadno od Vlajkovca
13. 06. 1991.	1	DQ87	4km zapadno od Banatskog Novog Sela

Utvrđeno je da se u mnogim evropskim zemljama broj gnezdećih parova (*Coracias garrulus*) poslednjih decenija drastično smanjio (Samwald, 1994). To je slučaj i u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, a verovatno ni u Vojvodini situacija nije bolja. Mađarski primeri su pokazali da je trend opadanja veličine populacije moguće zaustaviti merama aktivne zaštite. Zapaženi rezultati su postignuti pre svega očuvanjem starih stabala, postavljanjem veštačkih duplji za gnežđenje i izolovanjem bandera dalekovoda (Kalotás, 1998).

Da bi se na teritoriji Vojvodine sprovele slične akcije, preduslov je da se grupišu dosadašnji podaci, izvrši kartiranje i prebrojavanje parova. Tokom istraživanja ornitofaune Vojvodine u 1990. i 1991. godini, zlatovrana je zapažena samo na osam lokaliteta i to isključivo u Banatu (Tabela 1.) Obzirom na veliki broj terenskih izlazaka navedenih godina, mali broj posmatranja zlatovrana se može smatrati alarmantnim znakom.

LITERATURA – REFERENCES

- Gergelj, J., Šoti, J. (1990): Ornitofauna ribnjaka "Kapetanski rit". Ciconia, 2., p. 22–49. Novi Sad
- Kalotás, Zs. (1998); Szalakóta *Coracias garrulus*. p. 233–234. in Haraszthy, L (ed.) Magyarország madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
- Samwald, O. (1994): Roller *Coracias garrulus*. p. 340–341. in: Tucker, G. M. & Heath, M. F. (ed.) Birds in Europe: Their conservation status. BirdLife International, BirdLife Conservation Series no. 3. Cambridge.

Author's addresses: Jene J. Purger, Department of Zoology and Zoogeography Janus Pannonius University, 7601 Pécs, Hungary

(Uredništvo pretpostavlja da mnogi čitaoci časopisa "Ciconia" u svojim beležnicama imaju informacije o zlatovranama, i to ne samo iz Banata. Uredništvo će pozdraviti objavljivanje tih podataka u rubrici "Iz ornitološke beležnice". Tako će biti moguće da se proverí ocena J. Purgera o smanjenju populacije vojvođanskih zlatovrana.)